

インフルエンザ予防接種予診票（～64歳以下）

		診察前の体温		度	分
住 所	豊 根 村				
フリガナ	T E L ()		-		
氏 名	男 ・ 女	生年 月 日	昭和・平成・令和 年 月 日 (歳 ヶ月)		

質 問 事 項	回 答 欄		医師記入欄
今日受けられる予防接種について説明文（裏面）を読んで理解しましたか。	いいえ	はい	
【 6ヶ月～12歳の方のみ 】 今日受けるインフルエンザ予防接種は、今シーズン1回目ですか。	いいえ (回目) 前回の接種は (月 日)	はい	
今日、普段と違って具合の悪いところがありますか。	ある（具体的に）	ない	
現在、医療機関に定期的に通院をしていますか。	はい（病名）	いいえ	
最近1ヶ月以内に何か病気にかかりましたか。	はい（病名）	いいえ	
最近1ヶ月以内に近親者や周囲に麻疹、風疹、水痘、おたふくかぜなどにかかった方がいますか。	いる（病名）	いいえ	
最近1ヶ月以内に予防接種を受けましたか。	はい（予防接種）	いいえ	
インフルエンザの予防接種の際に具合が悪くなったことはありますか。	ある（症状： ）	ない	
インフルエンザ以外の予防接種の際に具合が悪くなったことがありますか。	ある（予防接種名： ） （症状： ）	ない	
今までに特別な病気（先天性異常・心臓・腎臓・肝臓・血液・脳神経・免疫不全・悪性腫瘍・その他の病気）にかかり、医師の診断を受けたことがありますか。 （“ある”の場合）その病気を診てもらっている医師に、今日の予防接種を受けて良いといわれましたか	ある（具体的に）	ない	
今までにひきつけ（けいれん）を起こしたことがありますか。	ある （ ごろ 回くらい 最後は () 年 () 月頃	いいえ	
（“ある”の場合）ひきつけ（けいれん）を起こしたとき、熱は出ましたか	はい (℃)	いいえ	
今までに間質性肺炎、気管支喘息などの呼吸器系疾患と診断されたことがありますか	ある (年 月ごろ 現在治療中・治療していない	ない	
薬や食品（鶏卵・鶏肉など）で皮膚に発疹やじんましんが出たり、体の具合が悪くなったことがありますか。	ある（薬、食品名）	ない	
近親者の中に予防接種を受けて、具合が悪くなった方はいますか	いる（予防接種名）	ない	
近親者に先天性免疫不全と診断されている方はいますか。	いる	いない	
【接種を受けられる方がお子さんの場合】 分娩時、出生時、乳児健診などで異常がありましたか。	ある（具体的に）	ない	
【女性の方に】現在妊娠していますか。	はい	いいえ	
その他、健康状態のことで医師に伝えておきたいことがあれば具体的に記入ください（投薬状況など）			

医師の記入欄：以上の問診および診察の結果、今日の予防接種は（ 可能 ・ 見合わせる ）
 本人（もしくは保護者）に対して、予防接種の効果、副反応および医薬品医療機器総合機構法に基づく救済について、説明した。
医師の署名

医師の診察・説明を受け、予防接種の効果や副反応などについて理解した上で、 接種を希望しますか（ 接種を希望します ・ 接種を希望しません ）	本人の署名（もしくは保護者の署名）
---	-------------------

ワクチンロット番号	接 種 量	実施場所・医師名・接種年月日
Lot No.	皮下注射 □ 0.25ml（6ヶ月以上3歳未満） □ 0.5ml（3歳以上）	実施場所 豊根村診療所 医 師 名 丹羽 治男 ・ 夏目 忠 接種年月日
(注)有効期限がきれていないか確認		

インフルエンザワクチンの接種を受けられる方へ

インフルエンザの予防接種を実施するにあたって、受けられる方の健康状態をよく把握する必要があります。そのため、表面の予診票に出来るだけ詳しくご記入ください。

【ワクチンの効果と副反応】

ワクチンの接種により、インフルエンザの発症を予防したり、たとえ発症しても症状が軽くすみます。そのため、インフルエンザによる重症化や死亡を予防する効果が期待されます。

副反応としては、まれにワクチンの接種直後から数日中に、発疹、じんましん、湿疹、紅斑、多形紅斑、かゆみ、血管性浮腫などがあらわれることがあります。全身状態として、発熱、悪寒、頭痛、倦怠感、一過性の意識消失、めまい、リンパ節腫脹、嘔吐、嘔気、腹痛、下痢、食欲減退、関節痛、筋肉痛、咳嗽、動悸、筋力低下など、また局所症状として接種部位に発赤、腫脹、硬結、熱感、疼痛、しびれ感、小水疱などが認められることがあります。いずれも通常2～3日で消失します。蜂巣炎（細菌による化膿性炎症）、顔面神経麻痺などの麻痺、末梢性ニューロパチー、失神・血管迷走神経反応、しびれ感、振戦、ぶどう膜炎があらわれることがあります。非常にまれですが、次のような重大な副反応がみられることがあります。

（1）ショック、アナフィラキシー（じんましん、呼吸困難、血管浮腫など）、（2）急性散在性脳脊髄炎（接種後数日から2週間以内の発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害など）、（3）脳炎・脳症、脊髄炎、視神経炎、（4）ギラン・バレー症候群（両手足のしびれ、歩行障害など）、（5）けいれん（熱性けいれんを含む）、（6）肝機能障害、黄疸、（7）喘息発作、（8）血小板減少性紫斑病、血小板減少、（9）血管炎（IgA血管炎、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、白血球破砕性血管炎など）、（10）間質性肺炎、（11）皮膚粘膜眼症候群（Steven-Johnson症候群）、急性汎発性発疹性膿疱症、（12）ネフローゼ症候群。なお、副反応による健康被害が生じた場合の救済については、健康被害を受けた人または家族が独立行政法人 医薬品医療機器総合機構法に基づいて手続きを行うことになります。

【予防接種を受けることができない人】

1. 明らかに発熱のある人（通常は37.5℃以上）
2. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
3. 過去にインフルエンザワクチンに含まれる成分で、アナフィラキシーを起こしたことがある人（他の医薬品投与でアナフィラキシーを起こしたことがある人は、予防接種を受ける前にお医者さんにその旨を伝え、判断を仰いでください）
4. その他、お医者さんが予防接種を受けることが不相当と判断した人

【予防接種を受けるに際し、医師とよく相談しなければならない人】

1. 発育が遅く、お医者さんや保健師さんの指導を継続して受けている人
2. カゼなどのひきはじめと思われる人
3. 心臓病、腎臓病、肝臓病、血液の病気など基礎疾患のある人
4. 前回の予防接種を受けたときに、2日以内に発熱、発疹、じんましんなどのアレルギーを疑う症状がみられた人
5. 今までにけいれんを起こしたことがある人
6. 過去に免疫不全と診断されたことがある人および近親者に先天性免疫不全の人がいる人
7. 間質性肺炎、気管支喘息等の呼吸器系疾患のある人
8. 薬の投与または食事（鶏卵、鶏肉など）で皮膚に発疹が出たり、体に異常をきたしたことがある人
9. 妊娠の可能性のある人

【予防接種を受けた後の注意】

1. 接種後30分間は医療機関にいるなどして様子を観察し、アレルギー反応などがあればお医者さんとすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。
2. 接種当日の入浴は差し支えありませんが、注射した部位をこすることはやめましょう。
3. 接種当日は接種部位を清潔に保ち、いつも通りの生活をしましょう。はげしい運動や大量の飲酒は避けましょう。
4. 高熱やけいれんなどの異常な症状が出た場合は、速やかにお医者さんの診察を受けてください。